

FICHA TÉCNICA

Feromona para *Tribolium Castaneum* & *Tribolium confusum*

1. IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO PRODUTO

Fabricante	Russell IPM
Distribuidor em Portugal	Agurys, Unipessoal, Lda
Morada	Rua Mariana de Andrade, 7 Armazém H, 2840-196 Seixal, Portugal
Contactos	Tel.: +351 216 033 561 geral@agurys.com / www.agurys.com
Produto	Feromona para <i>Tribolium castaneum</i> & <i>Tribolium confusum</i>
Descrição	Feromona sexual combinada com atrativo alimentar destinada à deteção, monitorização e avaliação da atividade das espécies <i>Tribolium castaneum</i> (escaravelho-vermelho-da-farinha) e <i>Tribolium confusum</i> (escaravelho-confuso-da-farinha).

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características	Especificação
Espécies alvo	<i>Tribolium castaneum</i> e <i>Tribolium confusum</i>
Tipo de atrativo	Feromona sexual + atrativo alimentar
Ingredientes ativos	4,8-Dimetildecanal e óleo de trigo (<i>Triticum oil</i>)
Dispensador	Tubo de plástico contendo feromona, ampola ou cápsula plástica, anel de plástico, pequeno tampão/disco de borracha impregnado com feromona
Embalagem individual	Saqueta hermética
Aplicação	Interior
Utilização	Monitorização e deteção precoce
Vida útil em utilização	8 a 12 semanas

3. ARMAZENAMENTO

Para preservar a eficácia do produto, recomenda-se o armazenamento nas seguintes condições:

Condição de armazenamento	Prazo indicativo
Local fresco e seco ($\leq 20^{\circ}\text{C}$)	Até 6 meses
Frigorífico ($4-9^{\circ}\text{C}$)	Até 12 meses
Congelador (-18°C)	Superior a 24 meses

Manter sempre as feromonas na embalagem original fechada até ao momento da utilização.

4. RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Aplicação

1. Retirar a feromona da embalagem imediatamente antes da utilização.
2. Colocar o dispensador no centro da armadilha.
3. Evitar tocar diretamente no dispensador.

Armadilhas recomendadas

- MultiTrap S
- Delta
- Outras armadilhas compatíveis para monitorização de insetos de produtos armazenados

Localização

- Insetos rastejantes: colocar a armadilha ao nível do solo.
- Insetos voadores: instalar aproximadamente a 1,5 metros de altura.

Cobertura

Uma feromona pode monitorizar uma área até aproximadamente 100 m², dependendo das condições ambientais e do grau de infestação.

Para uma monitorização mais detalhada ou para localização precisa de focos de infestação poderá ser necessária uma maior densidade de armadilhas (± 25 m²)

Frequência de monitorização

Recomenda-se a inspeção semanal das armadilhas e o registo das capturas para avaliação da atividade da praga.

Substituição

Substituir a feromona após o período recomendado de utilização ou antes, caso a armadilha esteja saturada ou conforme indicação do programa de monitorização adotado.

Após a substituição, eliminar o dispensador usado juntamente com os resíduos indiferenciados.

5. PRECAUÇÕES

- Utilizar luvas descartáveis durante o manuseamento.
- Evitar tocar diretamente no dispensador.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização.
- Lavar as mãos após o manuseamento.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar apenas para fins de monitorização.

6. INFORMAÇÃO ADICIONAL

Este produto destina-se exclusivamente à monitorização de insetos e não contém inseticidas.

As informações constantes nesta ficha técnica baseiam-se nos conhecimentos disponíveis à data da sua publicação e destinam-se a orientar a correta utilização do produto.

O utilizador é responsável por assegurar o cumprimento da legislação aplicável e das boas práticas de monitorização de pragas. Para informações complementares de segurança, consultar a respetiva Ficha de Dados de Segurança (FDS).